



ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА: COVID-19 и грипп



Самарская городская поликлиника №3

Вакцинация против COVID-19



Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

Зарегистрирована в Российской Федерации 11.08.2020 г.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

Эффективность вакцины «Спутник V» - 91,4% подтверждена в результате анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований. Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 100%.

Гам-КОВИД-Вак (СпутникV)

Предназначена для профилактики COVID-19 у взрослых лиц от 18 до 60 лет.

1. Вакцина вводится внутримышечно, в 2 этапа:
 - а) вначале вводят компонент I в дозе 0,5 мл,
 - б) через 3 недели (21 день) - компонент II в дозе 0,5 мл
2. Допускается при необходимости однократная вакцинация компонентом I в дозе 0,5 мл (Спутник Лайт)
3. Допускается интраназальное введение при помощи дозирующего устройства в один носовой ход на вдохе. Вакцинацию проводят в 2 этапа с интервалом в 3 недели.

Вакцинацию проводят в два этапа:

- вначале вводят **компонент I** в дозе **0,5 мл**,
 - затем через 3 недели (через/на 21 день)
 - - **компонент II** в дозе **0,5 мл**.
- Препарат вводят внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча, а при невозможности – в латеральную широкую мышцу бедра.



Иммунный ответ

Вакцинация вызывает формирование иммунного ответа (клеточного и гуморального) у привитого, который направлен против S-белка коронавируса.

Антитела, синтезированные в ответ на введение вакцины и направленные против S-белка коронавируса, препятствуют его адсорбции на человеческих клетках.

В результате у привитого формируется поствакцинальный иммунитет (невосприимчивость) к SARS-CoV-2.

Противопоказаниями для введения компонента I вакцины Спутник V являются:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии); при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинацию проводят после нормализации температуры тела;
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет и старше 60 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

Противопоказаниями для введения компонента II вакцины являются тяжелые поствакцинальные осложнения на введение компонента I.

Процедура вакцинации

- В день проведения вакцинации пациент должен быть осмотрен медицинским работником с обязательным измерением температуры тела.
- В случае повышения температуры тела более 37 °С вакцинацию не проводят.
- После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинского работника в течение 30 минут.

Проявления после введения

- Возникают в 1-2 день после внутримышечной инъекции и проходят на протяжении трех суток.
- Повышение температуры до 37-38 °C
- Ломота, головная боль...
- **РЕКОМЕНДОВАНО:**
- Ограничить физическую активность, прием алкоголя, посещение бани в течение 1-3 дней после вакцинации

Вакцинация против гриппа





Профилактика

Одним из важнейших способов
эффективного предотвращения
распространения инфекций с
воздушно-капельным механизмом
передачи является



специфическая профилактика –

**самый
эффективный
способ**
заранее оградить
себя, от угрозы
заражения
гриппом

ВАКЦИНАЦИЯ






Ежегодно осенью проводится массовая иммунизация против гриппа вакцинами содержащими штаммы к основным типам вирусов гриппа!

Вакцинация может предотвратить заболевание гриппом у 80-90% детей и взрослых. Если болезнь все-таки развивается, то у привитых она протекает значительно легче и со значительно меньшим числом осложнений.

Специфическая профилактика гриппа приводит к существенному сокращению заболеваемости и снижению смертности, сопровождающих эпидемии гриппа.





Обязательной вакцинации против гриппа подлежат:

- ⇒ лица старше 60 лет
лица, страдающие хроническими заболеваниями
- ⇒ эндокринной системы, хроническими заболеваниями дыхательной системы, хроническими заболеваниями печени и почек
- ⇒ беременные женщины
- ⇒ дети с 6 месяцев, дети посещающие сады и школьники
- ⇒ Работники образовательных, медицинских, транспортных, торговых организаций,

Какие вакцины используются ?

Для вакцинации против гриппа используются вакцины:

Совигрипп



Ультрикс



*Одновременная вакцинация от ковида и гриппа
одобрена ВОЗ и Минздравом России*



ВАКЦИНАЦИЯ

ПРОТИВ ГРИППА

Предварительная запись осуществляется

по телефону контакт центра

Самарской городской поликлиники №3

307-77-33

Вакцинация проводится бесплатно

На вакцинацию возьмите с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС

Приглашаем на вакцинацию:

Самарская городская поликлиника №3

■ В будние дни по адресам:

- - ул. Молодогвардейская, 202, кабинет 127 с 8:00 до 20:00
- - ул. Мичурина, 6, кабинет 26 с 8:00 до 20:00
- - ул. Рабочая, 34, кабинет 207, с 8:00 до 20:00
- - ул. Ленинградская, 45, кабинет 101 и 105, с 8:00 до 20:00
- - ул. Дачная, 27а, кабинет 27, с 8:00 до 20:00

■ В субботние дни:

- - ул. Молодогвардейская, 202, кабинет 127 с 8:00 до 20:00
- - ул. Мичурина, 6, кабинет 26 с 8:00 до 20:00
- - ул. Ленинградская, 45, кабинет 101 и 105, с 8:00 до 20:00

■ В воскресенье и праздничные дни:

- ул. Ленинградская, 45, кабинет 101 и 105, с 8:00 до 20:00

**Дорогие друзья, защитите себя!
Прививайтесь!**

